

新刊秘授外科百效全書

外科百效全書紀目

卷之一

癰疽脈法

癰疽總論

癰疽辨症

治法總論

切要方括

灸針灸法

敷洗煉割

去汚化毒

生肌斂口

諸般神膏

貼膏藥法

卷之二

口腦頸部

腦後枕發 腦心惡發 髮際六發

蜂窠惡發

腦前腦發

腦後枕發

腦心惡發

髮際六發

蜂窠惡發

對口天疽

乘梳瘋症

頭瘡疔毒

紅餅胎瘡

大頭腫風

邊頭癰風

而髮双發

耳陰腫耳

耳肉出膿

耳濕耳疔

合架瘋症

皮瘰子風

百虫入耳

螻蛄入耳

蒼蠅入耳

蟻子入耳

蜈蚣入耳

雜物入耳

水入耳中

黃豆入耳

走馬牙疳

口舌生瘡

舌止腫硬

舌長過寸

舌脹出外

口唇燥裂

生舌連砥

木舌風

換食風

驢嘴風

水茶

香茶飢

牙齒疼痛

癰腫牙

包牙重牙

牙風牙渴

角架瘋

抄牙瘋

懸腫唇

牙癰瘋

取牙神方

牙落重生

擦牙固齒

疥癩髮發

穿額瘋

魚腮瘋

猪領瘋

面生風毒

面癰由汁

粟房瘋

搭賴瘋

穀嘴瘡

紅鼻雀斑

羊鬚瘡

洗面藥

王容丸

香肥皂

咽喉瘡瘋

雙單鵝

纏喉風

單松子風

雙燕子風

魚鱗風

斗底風

重聘喉風

市巾風

落架風

怕蟻瘡

喉內生

梅核氣

漂喉痰核

瘰癧頸毒

卷之三

口胸腹部

乳癰乳癰

乳癰乳癰

乳頭癰裂

翻花楊梅

肺癰肺癰

心癰胃癰

腸癰腹癰

臍癰肚角癰

口諸癰

脾肚癰

右脾連癰

左脾癰

膺中癰

右搭肩癰

左搭肩癰

對心癰

龜背癰

散走流癰

腎俞癰

下胛俞癰

口臂腿部

腎癰臂癰

便癰便毒

瘡氣騎馬

路岐過檔

懸癰肛爛

穀道中癰

諸痔九漏

囊癰囊瘋

紫膏瘋

外腎腫大

陰伏生瘡

陰囊紅腫

玉莖腫痛

陰頭結毒

婦精瘡

陰蝕瘡

下疳瘡

蠟燭癰

婦陰生瘡

陰中生虫

陰門濕痒

陰內腫痛

陰腫如石

時壳風

茄子病

婦人陰痔

婦人陰冷

陰腺臭甚

交接出血

附骨疽症

緩疽石疽

兩腿腫痛

卷之四

○手足部

手背發

甲疽蛇指

梭壯丫口

天蛇頭

鵝掌風癬

手癰瘡

紅絲瘡

手足腫毒

雞爪牛虱

腋隻狐臭

肩疽

鶴膝風

兩足虛腫

合膝風

過膝風

膝頭腫痛

瘋痰脚疾

鼓椎風

八而瘡

腎臟風瘡

內外膝瘡

裙襠瘡

向前脚翻

脚瘡腫痛

脚跟瘡

螺螄發

脚發

脚背發

嵌甲

甲生肉刺

脚指丫瘡

脚縫搗痒

松皮爛瘡

脚瘡作痛

脚瘋癰毒

脚瘡有孔

遠年爛脚

瘡破成瘡

脚墊毒

遠行打泡

遠行腫痛

脚疔難眠

脚出汗

口遍身部

流注作毒

瘰癧疔瘡

瘰癧軟癰

大麻瘋風

楊梅瘡毒

卷之五

方瘡

走皮瘡瘡

五癆五癰

口雜治部

湯泡火燒

卷之六

破傷中風

癰疽瘡

瘰癧瘡

益腎強骨

口急救部

救縊死

百効全書

多骨疽

侵淫瘡

紫白瘰癧

杖瘡打傷

神除汗斑

寒凍成瘡

竹木刺入

香方

救溺死

救東死

救西死

救南死

救北死

細花瘡

血風瘡症

黃疹瘡

折傷接骨

金鎗重傷

法云刺字

手足開駁

針灸有傷

器髮香柳

救東死

救西死

救南死

救北死

楊瘡

白蛇瘡

走皮風

蛇皮瘡

熱中瘡

濕後生瘡

暑熱成瘡

濕瘡

馬鬚黑髮

鬚髮脫落

救東死

救西死

救南死

○中毒部

解信石毒

解山砒毒

解水粉毒

解川子毒

解巴豆毒

解諸草毒

解豆腐毒

解蒜菌毒

解鼠莽毒

解鴉鳥毒

解六畜毒

解河豚毒

解雞寶蜈蚣毒

解中諸物毒

解貓毒

解中金鐵毒

解中諸毒

解中諸物毒

解中諸物毒

○誤吞部

誤吞碗瓦

誤吞鐵針

誤吞銅錢

誤吞金銀

誤吞玉石

誤吞蜈蚣

誤吞水蛭

誤被螺螄

誤被骨鯁

誤吞玉石

○王獸傷部

治犬咬

治蛇咬

治蝎螫

治虎咬

治黃蜂螫

治鼠咬

治蜈蚣咬

治蜘蛛咬

治壁虎咬

治馬咬

治八脚咬

治溪毒

治蚯蚘毒

治人咬傷

治蛆蟻

藏引仙法

初刊秘授外科百効全書卷之一

太醫院醫官金谿縣人
續谷濟濟書林五尺樓梓行

癰疽論

癰疽數浮陽沉陰浮數不熱但惡寒浸若知痛處急炙或鍼洪
數病進將有膿惡消實緊促內消可禁宜托裏者脈虛濡遲或乳
潰微潰後亦宜長緩勿治短散則危結促代沉必死無疑

凡諸脈浮數脈應當發熱其不發熱而反洒漸惡寒若有痛處
一必發癰疽脈微而遲反發熱弱而數反振發寒當發癰疽○脈
浮而數身熱無熱形嘿此胸中微燥不知痛之所在其人必發

癰疽論

癰疽毒要氣血勝內外皆因濕熱凝純陽燄赤潰歟易健食便秘
腫而疼純陰色黯只微腫硬如牛皮不痛焉又有半陰半陽症似

腫非腫疼非疼似赤非赤潰非潰用藥回陽乃可生挾風多痒挾
氣痛濕腫挾食寒熱增惟有虛瘡色淡白熱瘡歟赤十分痛金石
藥毒蘊成者堅硬如石不痛焉虛勞瘦弱藥衛滋患處重如金石
然因有骨蒸潮熱盛治宜滋補不宜泄外感寒熱發毒者飲食如
常甚腫疼脉浮數而邪在表托裏微汗表散痊內傷飲食積毒者
脈毒異常口渴煩脉沉寔而邪在裏急與寒涼攻裏然虛損房勞
傷鬱怒邪在經中無裏表不可妄施汗與下補形氣與脾胃佳潰
後托裏排膿毒膿盡肌肉自肤平內發初起灸最妙外傷成瘡丹
田禁熱毒半軟膿已熟鍼法施行正相當癰疽止痛非得已毒口
不斂必開張洗能疎毒活血氣貼膏不被風寒傷婦幼患此無他
異婦宜調血功宜清雜症仍以瘡為主清血清心要酌量一善身
安食知味二善大小二便調三善潰膿臭穢四善神清語音長五
善脉氣和平好此屬肺症病微良一惡煩燥口乾渴或腫或閉或

淋瀝二惡潰後腫痛甚膿色臭敗不可當三惡目視必不正黑睛
累小白睛赤四惡乃喘粗短氣且兼恍惚喜卧床五惡脾腎二經
虧有痛不便四肢重六惡是胃氣虛弱嘔棄食少不知味○七惡
穀嘶唇鼻青面目四肢腫且黃陽虛寒戰腹疼甚自汗飢逆腹霜
鳴虛極發躁欲坐并羈狀變症身及張陰虛肺熱夜不寐消渴便
活血難藏五善見三客易治七惡見四真惡瘡瘡有一般無名腫

癰疽辨論

凡人初生瘡之時便竟壯熱惡寒拘急頭痛精神不寧煩燥飲冷
者其患瘡疽必深也若人患瘡疽起居平初飲食如故其瘡雖秘
凡癰疽始發即以隔蒜艾灸甚妙蓋火暢達拔引鬱毒此從治之
意也惟頭爲諸陽所聚艾炷宜小而少但灸要四邊皮縮或痛
則灸之不痛或不痛則灸至痛時方住

凡癰疽膿成即當驗膿之生熟淺深施針可也用手按之熟則有

膿不熟則無膿重按乃痛膿之深也輕按即痛膿之淺也按之
不甚痛者未成膿也按之即復起者有膿也按之陷而不起者
無膿也必是水也若膿生而用針氣血既泄膿反難成若膿熟
而不針腐潰益深瘡口難斂若瘡深而針淺內膿不出外血反
泄若瘡淺而針深內膿雖出良肉受傷故云妄施針刀傷肉出
血不止者危也如用針每宜桐子燒過必須針口向下以便流
膿後用綿纏刷帚拭套出

凡外敷貼藥亦發表之意一方謂貼冷藥有神効夫氣得熱則散
得冷則斂何謂神効經曰發表不遠熱是也

凡癰疽未潰前極痛者爲熱赤便秘宜解毒湯之類若作膿痛者
排之膿脹痛者鍼之已潰膿出而反痛者此爲虛也宜八物湯
加黃芪之類補之亦有因登廁犯穢氣所觸而作痛者宜藥中
加乳香芷芍之類和之所通風寒者宜藥中加防風蠶絲之類

如癰疽未潰不飲由于肌肉不生肌肉不生由于癰疽不去腐肉不去腐肉不去由于脾胃不壯血氣不旺治宜補托為主而佐以行經活血之藥要知瘡口雖斂或漸大漸開出血者死

凡癰疽潰爛乃血氣兩虛宜參芪以補氣當歸地黃以養血

凡癰疽泄瀉有因寒涼傷脾者宜六君子加砂仁之類亦有脾虛

下泄者宜補中益氣湯之類要知癰疽嘔瀉腎脉虛者必死

凡癰疽便秘因熱毒入腑火攻心逆發熱逆便秘結固宜通之又

有伏熱陽氣拂鬱而亦便秘者為邪火在經宜打以淡之潰後

氣虛血潤便秘十全大補湯治之或因入房傷腎便秘者加姜

附以回陽氣則大便自潤凡便秘能食而肚腹不脹者切不可

下若腹脹而便秘者用猪胆一枚炙去頭八莖醋少許以搜手

管挿入肛中灌送道內即通

凡腫瘍時嘔者當作毒氣上攻治之潰時作嘔當作陰虛補之潰

後作嘔當作理虛補之若年老泄後發嘔不合寧參芪白朮膏
峻補河間謂瘵瘵者濕氣侵于胃宜倍白朮

凡陽虛因誤服寒涼或瀉後勞後或吐瀉之後或誤入房夢遺或
外邪所乘初則虛火假症仍熱熱頭痛良久寒戰咬牙脰痛雷
鳴泄瀉飢逆自汗盜汗急用托裏溫中湯後用六君子湯加附
子或加姜桂甚者用大劑參芪歸朮倍加姜附以手足濕為度
凡癰疽潰後熱惡寒作渴怔忡睡卧不安陽衰陰盛發燥脉洪
大按之微細或無此陽虛極焉然牙關緊急脰背反張變為瘰
症陰數或無汗惡寒或有汗不惡寒俱宜八味丸料加參芪歸
朮大劑煎服

凡病癰疽者原稟瘦怯或房慾傷精或瘡出膿多或誤汗下以致
日晡潮熱口乾作渴夜寐

王之要知便乃無者死

犀角散血四物湯補中益氣湯

凡瘡瘍時或愈後口鼻吐衄牙宣齒路皆因瘡瘍出血虛火動而錯經妄行當求經審其因而治之要如火凡失血過多而見煩燥或塊等症勿論其脉急用申人參湯補之經云血生于氣者非其濕參芪歸朮之類以生心肝之血決不能悉若諸熱厥大

○治法總要

凡瘡癰疽瘋毒等症先辨陰陽如純陽以陰消爲主內服清毒散內疎毒連湯之類外敷抑陽散半陰半陽症內服托裏消毒散之類外敷陰陽散如純陰毒以托出爲主內服十宣散或補中益氣湯加姜附人酒煎之類外敷抑陰散但久開口有汚肉即用武燻方每燻後用玉紅散搗上後又燻俟汚肉朽爛將利刀刮去汚肉但割至痛即止割後用化毒丹搗二三日每以肉湯或鹽茶洗後以貴室生肌散一歲一口將近用白硃砂散四散日滿肉滿用稀錦欵口方但每搗藥先宜以麻油抹毒

一切要方括歌

平血飲天麻連翹升枳桔防丰並稍虫退桑胡同亦芍黃芪干葛
蒲功央八參羌活當歸尾赤芍蒼蒲切真燒再用金銀花一兩
癰疽疔毒能消

凡癰疽背發無名腫毒先宜服此但潮退去柴胡全胡胡藟後服
托裏散白芷當歸入參芍藥芎陳皮厚朴白朮大附子茯苓黃
芪立服之此治陰毒甚宜

一醇散故芷小茴牛夕婦尾蒼朮芪銀花並稍并草節防丰赤芍
稍相宜治癰疽初發赤腫乍寒乍熱者其藥各等分爲末如病
在上加荆芥并麻病在中加羌活独活病在下加兵即木瓜好
醋煎熱生酒調吃盡酒爲度將藥渣搗爛放患處縛住政外英
蓉葉在根研爛敷毒上中出一孔後服十宣散
十宣散入參黃芪桔梗防丰芍當歸桂心川芎香
正甘草爲末

酒調此治虛寒人病癰疽純陰毒症及已成未成者但痛甚以
乳沒倍當歸病在足加木瓜此方兼諸毒內消丸服又治陰
加味流氣飲參芩歸桂黃芪芷防手木香赤芍烏梅大抵諸毒自
三治陰毒在手足甚者

清毒散防丰荆芎白芷苦參羌活同獨活黃芩黃柏好棧胡從等

此方兼諸毒內消丸服善治純陽毒症如痛甚加乳香沒藥

諸毒內消丸散般白芷大黃黑沉香木香乳香并沒藥龍衣為

丸葉甚良右方白芷紅大黃細餘各粒不問陰毒陽毒俱可

內疎黃連湯大黃翹苓梔薄南木香檳榔白芍當歸桔甘白芍

治純陽症腫硬發熱嘔吐大便秘結脉洪而實

托裏消毒散參芪當歸白芍廣陳皮白朮茯苓連翹芷金蟾乾花

治半陰半陽症腫痛慢而不赤者宜

秘傳萬金內托白芍銀花赤葛根天冬桑皮赤小豆熟黃白芷

百方全書卷之六 治毒方 五

稍桔梗半夏杏仁乳沒藥羌活連翹黃芩義麻黃白朮川芎杜陳
皮防丰柴胡焉當用黃芪蒼耳子荆芥歸枳芍草全爲末看病加
咸用連翹葱姜全煎

右傾出加好酒一盃開服 治諸般背發惡瘡不問陰毒陽毒
俱宜消毒散黑丑當歸銀花貝母連翹芷乳沒大黃甘草節防丰
山甲姜由桂

治背發甚効百毒亦好但頭毒加細辛手毒加木通脚毒加木
瓜牛及乳瀉加瀉蘆已成者加黃芪右共爲細末酒調八錢如
不通再服八錢以通爲度

三奇湯銀花姜由赤芍甘草節蜈蚣山甲疾利連翹亮歸尾大黃
皂刺充治癰疥癰瘡便毒四服其毒即化爲膿從大便洩出并
治諸般腫毒初起亦妙每味用仁大黃倍下以酒水各一盃至一盃

預防敗毒散桔梗甘草防荆芥枳壳前胡羌獨活各一盃至一盃

治一切風流丹毒風疹鼠推風腫及大頭疔等症如內熱加茶連口退如二花粉

蠟凡九內只一般黃蜡二兩溶化良待溫八明凡三兩衆

治諸核癰瘰癧湯便毒諸瘡極能退血收膿生肌歛口每日二服酒下三十不飲酒者熱水下肺癰密湯下

竹黃湯黃芩生黃芩歸芍草芍石羔人參麥門冬牛下霜的淡的

葉生治諸般發毒煩渴者

止痛散當歸時時人參芍藥及官桂甘草生地各二錢水服是

治諸毒山癰言止痛

內固清心散一砂參參雄黃腦子麝白芷紫豆皂角八制神曲

治惡瘡癰疽癰痛依渴煩燥每用密湯送下一錢

透膿散藥只一般出天蛾兒蚕蝨良一個燒灰酒調服立時膿盡

治諸般癰疽及貼骨各癰不破者不用針刀一服不移時而自

透髮試有驗但此藥用一個只是一個瘡口若用兩三個則瘡口多切不可輕用

護心散乳香一錢紫豆粉用四錢兼甘草湯調時七

治諸疥疥腫曾經汗下毒氣攻心迷悶嘔吐喘嗽泄瀉而痛喉

舌生瘡名曰秘絕初起宜服此藥最能又出毒氣不致內陷

後亦可間服加山机杞皮為末二錢又可外敷止痛

散血疎風湯薏穗牛蒡烏藥甘草隨防丰金銀花羌活血紅瘡毒

腫痛區白其升麻能止痛黃柏散血及涼皮祖傳地黃全合

加八塩酒具神机

治血風黃疽諸瘡腫熱痛痒俱宜屢試有神効

防風通至散歸芳赤芍大黃麻黃同荷喬確羔滑芩梗荆芥白

治耳目口鼻唇舌咽喉風熱風痰及瘡癰發班打傷諸症

次鍼灸法

隔蒜灸法

先以濕帛裹毒

上立侯帛先乾處爲瘡頭記定

後用独蒜去兩頭切中間三分厚安瘡頭上用艾炷于蒜上灸之每五炷換蒜再灸如瘡大有十數頭作一處生者以蒜搗爛

鋪患處鋪艾灸之蒜敗再換

治一切癰疽腫毒大痛或不痛或麻太或色白或色紫不起發不作膿最宜多灸未成消已成殺其大勢

桑枝灸法

用桑枝烘着吹熄火端以火頭灸患處一口三五

次每次取腐肉腐動爲度若腐肉已云新肉生又宜灸四圍

一治發背不起發不腐併治陰瘡瘰癧流注腫毒寒邪所襲久不

愈者未潰已潰俱宜

巴豆鍼

每用三稜針簪巴豆灯上燒紅將帛揉淨針毒鍼之

治一切惡瘡惡毒惟針核瘰癧將篋篋七住核淺針數次即消

一雷火神鍼

開陽花新艾各一兩川烏草烏各五錢牙皂三錢

雄黃漏更各一錢射香一分為細末綿紙捲成條加鐵筋硬灌
七重火需用力施針痛處

治一切瘋損板有溜肩等症

葱熨法用生葱搗爛炒熱熨患處至冷再換再熨治流注
結核骨癰癰脹等症先用隔蒜灸餘腫尚存用此熨之以助氣
血行壅滯又治跌打損傷止痛消腫散血之良劑

○敷洗藥割法

千金散 雷公紫紫金皮焙切為末鴨蛋白調敷

又方山砒霜春葉各塊為細末濃醋調敷

治背發及各樣損風惡毒俱宜

攔風膏 大黃七柏草烏南星五倍子酒曲各一兩黃芩蜜金白

正各五錢芙蓉葉花二兩共為末鴨蛋白調敷

陰陽散 赤芍白芷石菖蒲五倍子各二兩独活一兩紫荆皮王

兩為末或葱酒或醋調敷

治癰疽腫毒流注半陰半陽腫

抑陽散 天花粉三兩黃白芷赤芍各一兩為末茶湯任調服

治癰疽陽症

抑陰散 草烏白芷赤芍南星各一兩肉桂五錢葱湯或熱酒調敷

治癰疽無論虛寒腫不消散或不消飲或筋壅骨痛一切冷症

毒敷藥 赤石脂三兩煨過石灰炒過一兩為末桐油調搽四

圍止痛出膿

豆膏 單巴豆炒焦研如膏酒臨用制之庶不乾燥如發背中

夾肉死塗之即腐未死塗之生肌惡瘡膿瘡久不收斂內有毒

根以帚攪藥納之毒根去即斂

芙蓉膏 芙蓉葉黃荊子各等分為末共入石白內搗極爛用雞

子白調搽患處留頂如烟霧起立瘡此方用在未潰之前或將

潰之際治發背癰疽疼痛如錐刺不可忍登時痛止如神

跌打膏 蕎麥稿灰淋汁二碗熬至一碗下血蝟乳香沒藥各三

分爲末入汁內再熬去半碗取下待冷入黃丹雄黃硃砂各昔

分好石灰入鐵爲極細末共一處放藥汁內攪勻成膏磁器收

住用三棱針刺破將藥入內宜送深八到底不三次全愈

鹽草洗藥方 治久新癰疽皆登痂毒

白茅嘴根 退癰紫背烏柏根 離三白草 通靈草 草根 煨白毛

桃廚米楊柳根 毛狗香 收精穿山蜈蚣 止癰 癰疽 班梢根 去

融烏桕根 去毒乳抱根 離青 未香 離赤葛根 離鉄 菱角 離腫 住

白馬骨 離老茶 臭椒 果椎 離 三 角 楓 離 隔 山 叶 止 痛

回封草 離 痛 退 烏 茶 離 燭 右各味煎水煙洗七後用敷藥

看臣洗藥方 治背發乳癰人面腫瘡及諸惡瘡癰毒腫痛

防風 白芷 赤芍 苦參 甘草 荆芥 艾葉 銀花

羌活 獨活 歸尾 牙皂 葱白 茶脚 蒼耳子 荷葉
蒂 桐子仁 土房蜂

右水煎洗燠後溫冷洗至乾淨絹衣抹干用清油硬調攪風膏
之類敷之如無膿不再留口一日一換如有膿可留口出毒未
膿才用藥完便以黑帛蓋絹帶緊縛如外臙瘡三日一換不要
肉湯洗法 治一切瘡疔有口

用公猪蹄爪肉一斤煮汁分二次去油花肉渣方入白芷羌活
蜂房黃 赤芍當歸甘草各一錢同煎十沸俟溫以絹蘸湯稍
洗惡血隨洗而下

艾燠方 臭桐灰水熏 或猪根醋燠 或五倍醋燠 或

野山查根醋燠

武燠方 千軍勇數濃醋燠 燠于軍勇即 或山虎濃醋燠 燠惡血

陽花
是也

代割方

蝟牛蜈蚣推重漢各焙切爲末麻油抹毒癰上瘡不破

方蜘蛛打爛瘡毒上即破

瘡毒及喉風腫痛不用針方

只以新生鵝卵壳燒灰存性爲末

醋敷腫處立時即破出血

去汚化毒

點玄丹

明凡一兩金脚信五錢火煨存性爲極細末善去惡毒

五紅散

明凡煨過與雄黃各等分爲極細末攪但汚肉多宜多

下凡汚肉少宜多下雄黃

化毒丹

煨石羔一兩輕粉五分爲極細末

凡惡瘡作痒者用此甚宜或入別藥內亦好

金華散

錦文大黃炒斷烟爲極細末

凡惡毒惡瘡作熱作痛用此甚宜或參入他藥內亦妙

白搗入

即點玄丹麝香爲末或爲條又一方不用人言雄黃

黃樟八 用人言破砂焙等分麵糊然成條或為丸

佳痛散 乳香末藥各三錢寒水石煨過五錢滑石五錢水煎

分其為頭細末攪之

生肌飲日

主 凡敗一象牙末一錢赤白胎三錢天靈蓋五分為極細末

銀 石膏八兩鹽調黃泥作一罐子將石羔放內火煨過每

兩 飛過黃丹五錢亦能生肌

貴 寶生肌散 龍骨^炙血^竭 石乳 沒藥^炙 黃丹 鱗^炙 鳧^炙 茶

礞^炙 硝^炙 上各一錢乾^炙 粉三分皮帛炒珍珠三分射香半分水

片一分甚加瑤瑤象皮^炙 血衰氣弱者不宜用水片

白 硃砂散 用上好雪白^炙 磁器為極細末

欬口 稀錦散 用稀發草^炙 乾為極細末極或用雞內錦為極細

末但每先宜麻油抹毒方攪此日足肉滿宜用

諸瘡合口散 山鰍黃泥包煨熱後去泥爲末麻油調搽或單夏
母爲末攪之

背癢及諸毒不合口神方 用桑條撓蜘蛛網如綿紗縶子大將
灯火熾之即將鵝毛制下灰以帚乘頻熾頻制下收灰每遇木
合口者先將麻油及水各一盞火煎過將鵝毛蘸水洗淨取肉
方將灰攪之

○諸般神膏

萬應膏 龔九皋兄傳 防丰荆芥何首烏草烏各八錢独活木別紅
內消白芨白飲芎藭歸尾白芷稍杏仁乾白頭翁各五錢黃芩
黃柏大黃南星各一兩威靈仙蒲黃胡麻仁苦參各三錢川山
甲七片江子十個草麻子三十蠟蛇一條油髮少許用麻油二
升浸過前藥一夜次日溫桑火煎至八分俟藥清熱乾淨起叻
棕濾去渣方以飛過黃丹一斤水粉三兩逐時煮水油內兩

將成膏却將貴主生肌散半碗撈入油內即住火將大盆盛水以膏放在水上去火氣但熬時必以桃柳枝撈不住手切忌有孝有孕及雞犬各項厭惡

善治遠近腫瘡癰癤疔疔癰疽癰毒風損等症

百羅膏

生地黃熟地黃赤芍白芍白芷兩頭尖各五錢木別草

麻各百粒巴豆五十川山甲五片用真桐油一斤將前藥浸一宿剪成炭浮起用棕濾過入炒過黃丹六兩水粉二兩百草霜二兩文武火熬成膏滴水成珠然得硬時便入血竭末五分乳香沒藥五錢脂各二錢撈勻

善貼惡瘡及癰毒未破者用藥引子以五倍燈過為灰五分第灰四分白丁香三分飯為丸如黃豆大護千膏藥中一貼即破太乙膏 玄參白芷當歸肉桂大黃赤芍生地各一兩用麻油二斤半浸過夏三日冬十日春秋七日方入鍋鍋內文武火煎至

藥枯黑去渣入黃丹十二兩將桃枝不住手搗更至滴水成珠
軟硬得中即成膏收貯治一切癰疽腫毒不問年月深淺已
成未成者並宜之如發背先以溫水洗拭推緋絹貼之更用
冷水送下血氣不通溫酒下赤白帶下常歸煎湯下咳嗽
及喉閉纏喉風綿裹含化津下切風赤眼貼兩太陽穴更以山
梔煎湯下打撲傷損陳皮煎湯下婦人經閉腹先作痛貼
之經行痛止一切疥瘡別煉油少許和膏塗之諸瘰癧癰
癰毒及瘰癧先用煎湯洗淨貼之並用溫酒下三五

膏可久不壞愈久愈烈

虎太咬傷湯火金瘡傷外貼內服此

雲母膏 川椒白芷赤芍肉桂常歸當歸黃芪白芨川芎木香龍
胆白欬防風厚朴桔梗柴胡蒼朮黃芩附子白苓良姜百合皮
松脂人參各五錢甘草柏皮桑白皮陳皮枳殼枳實各一兩用

清油二斤半浸封七日文武火煎以柳木不住手撓候面沸乃
下火沸定又上火如此者三次以藥枯黑癩去查再熬入薰丹
二十面乳香鹽花血竭射香各末五錢雲母礬石各末四兩以
槐枝不住手撓灑水成珠不乾不要為度磁器收貯候溫將水
銀二兩以綿包定以手細彈鋪在膏上各套膏每用時先括去
水銀或九梧子大服或雜絳布上貼隨時用之如發背敗漏
剪湯洗拭歸之內服一兩分三次溫酒下來成者即愈
乳癰擦癰骨癰毒穿至骨外貼內服一兩分三次服下甚者即
瀉惡物腸癰內服五兩分五次甘草煎湯下未成膿者消已成
膿者隨其下膿下後每日仍酒下五丸膿止住服
發頤發鬚發眉發耳脰癰牙癰牙疼癰癰及一切癰癰腫毒並
外貼即時毒消痛止而愈甚者內服風眼貼兩太陽穴小腸
氣茴香煎酒下一分日二服即愈難產溫酒下一分血暈

欲死姜汁和童便溫酒下十九即醒
即生 壁虎蜘蛛咬外貼番糖口 虎豹咬并草煎湯先拭點
之每一日一換 蛇犬咬外貼內服十九生 油下箭頭入肉外
貼每日吃熟菜豆少許箭頭白出 中毒藥酒下一分每日一
服四日瀉出惡血立瘥忌年血 如收此藥防身以蠟布裹包
令風乾可收三十年

保真膏

真麻油二斤半第二下搗碎甘草四

兩三下天麥二冬法熟地黃生地黃酒官桂牛膝菴蓉酒鹿
茸鮮遠志其酒湯煮川續斷紫稍花木別子谷精草大附子白
朮杏仁蛇床虎骨續斷免絲子杜仲各秤末四錢下松香四兩
黃丹一斤過飛五下硫黃雄黃龍骨赤石脂細末各四錢六下
乳香沒藥丁香南木香細末各四錢七下當門射香蟾酥真陽
起石細末各二錢海狗首一個八下黃礬六錢石藥煎法用

第一口桑柴燒用文武火將第一下二下甘草與香油先熬至
 大沸又下第三天門冬十九味粗末熬至各味藥枯焦黑用細
 密絹巾濾去渣却下第四松香黃丹以槐樹條一把不住手攪
 藥滴成珠不散為度方第五硫黃等細末攪勻住火又下第七
 射香第細末攪勻再滴水成珠膏藥好了却又下第八黃蠟再
 攪勻盛磁器內用油帛裹浸并水申四五日出火毒用此能
 鎮玉液存精不泄是旺不死通血脈強身壯及老還童鬚髮服
 黑固真精善御器雖數次不泄去膏方洩止則有孕此藥百無
 所忌且能滋皮膚治腰膝疼痛下元虛損四肢麻木牛身不遂
 五勞七傷冷氣攻刺及去小腸膀胱氣二三十年勞瘵遠年近
 日風蠱等症筋骨酸痛陽事不舉每用藥三四錢攤綾絹上貼
 腰眼二穴一個膏藥可貼得六十日欲御器則將一個貼臍上
 上此膏一個可賣銀五錢切莫輕視

瘋損膏

三角楓珍珠藤墜斗草各三斤水胡椒草十斤共洗淨

搗爛取自然汁同姜汁半斤好醋二碗鮮米泔二碗黃丹末僧末一兩同煎成膏任用甚神

千槌膏

松香八兩乳香沒藥七錢銅青一兩草麻子一百五十

個杏仁去皮尖一百五十個同槌成膏不要見火或硬用滾湯

的熱水撓開但攤膏必須藍綾布

玉露膏

黃丹半斤水粉四兩研勻用麻油一斤煎至滴水成珠

方下乳香龍骨血竭兒茶輕粉各末二錢撓勻磁器收時

治癰疽瘰癧生肌斂口止痛如貼熱瘡及艾炙火瘡不瀆下乳

玉容膏

香葉薄荷丹用水粉黃丹二味

玉容膏 香葉薄荷丹用水粉黃丹二味 一兩二味火化開八黃丹末一錢

寒水石火煨一兩為細末溶化為膏貼患處

治發背癰疽潰爛用此生肌止痛外護如神

五油隔帛膏九華見傳香油松瀝油木油猪油雞子油調勻用

如諸瘡作痒內八金華散五錢明肌散一兩調貼患處如諸瘡

痒痛不作痒內八金華散一兩乳香沒藥末各三錢貼患處如

隔帛白玉膏如屋傳先用雄猪油二兩熬去渣隨以黃蠟白蠟各

二兩同熬化听用再將草麻仁二兩搗如泥入鉛粉四兩麻油

四兩雞子油二兩和勻候冷入乳香末三錢輕粉五錢水片五

分攪勻磁罐收之每用時以胭脂或綿片上藥貼在患處

金花隔帛膏 先以黃蜡二兩麻油四兩油頭髮少許同煎候髮

焦便將大黃一兩黃連黃芩黃柏各五錢俱炒黑為末及乳沒

各五分同攪入干內作膏

能貼內外癰瘡熱毒惡瘡水泡火瘡奶癰等症甚効

四應膏 應圖製先以桐油二兩黃蜡化入煨過石羔七錢生

大黃七錢揀勻開膏

治癰瘡裙襠杖瘡松皮爛等瘡但每用此膏一日一換不用水洗不見風處貼如膿水乾及肉滿再不必換藥上用原膏貼老瘡若四弦作痒用生姜自然汁或揉痒處或入膏末如癰瘡用姜葱煎湯洗後方貼仍服荆防敗毒散四貼十全大補湯四貼癰瘡不痒如痛用大附子肉桂爲末少許塗瘡口上貼膏藥如多年肉爛內外癰瘡先以蘿蔔洗以薑葱搗爛敷一日一洗一換油帛隔絹扎五日方貼膏不換神仙膏 世進主傳專治男婦小兒不分遠年近日五癆七傷咳嗽痰喘氣急左癱右瘓手足麻木遍身筋骨疼痛腰脚軟弱偏正頭風心氣疼痛小腸疝氣偏墜跌打傷損寒濕脚氣癰癩走氣疳塊男子遺精即濁婦人赤白帶下月經不調血崩


治無名腫毒癰癤瘰癧瘡楊梅頑瘡誤服輕粉致傷筋骨疼痛不能
爲惡毒腫爛成瘡大如盤或流黃水或流膿血遍身臭爛不能
動履者即此膏藥除根永不發

川芎	白芷	生黃	熟黃	當歸	白朮	蒼朮	陳皮
香附	枳殼	烏藥	半夏	青皮	白蘇	細辛	知母
貝母	杏仁	黃連	黃芩	黃柏	枳子	大黃	桑白皮
柴胡	薄荷	赤芍	木通	桃仁	玄參	朱苓	澤瀉
桔梗	前胡	升麻	麻黃	牛膝	杜仲	山藥	遠志
續斷	良姜	甘草	連翹	藥木	西陳	地榆	防風
荆芥	羌活	獨活	苦參	姜蚕	天麻	南星	川烏
草烏	羌花	巴豆	何首烏	金銀花	白蘇皮	蒼耳頭	
猓五加皮	青風藤	益母草	兩頭尖	五倍子	大楓子		
川山甲	威靈仙	蜈蚣	桃柳榆槐桑楝楮枝				

右藥共七十二味每一味用五錢各要切爲粗片用真芝蔴油
十二斤浸藥在內夏浸二日冬浸半月方可煎藥黑枯色爲度
用麻布一片漚去渣將油再秤如有十數斤加飛過黃丹五斤
如油有八斤加黃丹四斤依數下丹決無差矣將油再下鍋熬
黃丹徐火的投下手中用槐柳棍不住的攪火先文後武熬成
滴在水中成珠不散春夏硬秋冬軟此是口決磁器內貯之臨
用時細藥 乳香 沒藥 血竭 輕粉 朝陽砂 樟片腦
麝香 龍骨 游標硝 赤石脂 右細藥十味共爲細末礱
器內收貯臨用椎膏藥搽上此須生肌止痛調血氣去風濕甚妙
五勞七傷遍身筋骨疼痛腰脚軟弱婦兩膏肓穴兩腎愈穴兩
腋爽喘氣急咳嗽貼肺俞穴華蓋穴膻中穴 左癱右瘓手足
麻木貼兩肩井穴兩曲池穴 男子遺精白濁婦人赤白帶下
月經不調血出崩漏貼兩陰交穴 關元穴 赤口痢疾貼丹

田穴癰疾男子貼左臂女子貼右臂即止
 腰疼貼命門穴
 如小腸氣痛氣貼膀胱穴
 偏正頭風貼風門穴
 心氣疼痛
 貼中脘穴
 走氣貼兩章門穴
 寒濕脚氣貼兩三里穴
 一切無名腫毒癰瘡疥癩楊梅頭瘡及跌撲傷損瘡塊不必尋
 穴皆本病所患之處貼之曲池

背面



正面



貼膏藥法

如瘡有膿血不淨，癰癤閉，破口用藥水洗淨拭乾候

水氣乾却，用膏貼上。後有黃水膿血流出，用稀損從側畔出一日一換。黃水膿血止而日三日一換。貼至愈，凡洗拭換膏必須預脩，即貼之，新肉惡風故也。

取

久疽久漏中朽骨法

烏骨雞胫骨以信石實之，鹽泥固濟火

煨通紅，地上出火，毒取骨為末，較丸如粟米大，以皮昏擦，送入竅內，外用膏藥封之，其骨自出。

柳發



髮疽



蜂窠癰



天疽



腦癰

腦後頭後頂必發

肝陽毒聚頂太陽膀胱主之久積痰火濕

熱上蒸于腦也

大凡頭腦上生癰

服降火化痰消腫托裏之藥不可輕易針

灸惟初起隔蒜灸之

但艾炷宜小而少若勢成者外敷攪瘋

膏陰陽散之類若熱

連頤而穿口必主穿喉而絕若服藥色

黯不潰不斂為陰精涸

而然不治但施方必隨症而治之

癰疽生于腦前者名腦

又各癰冠發若生于腦後枕處者名枕

發但宜用千金托裏散

茶歸身 大川芎 穿山蜈蚣 小

口于金托裏散

黃芪 二防風 羌活 正頭 山慈姑 新刀麻 京赤

黃芪 二防風

五方 半酒半水煎服 毒未成者

方 川山甲 煅成 鐵五

後膿血去多則氣血 臨陽宜服

點則消已成者三點即

內補散六貼方能合 口內補散 好一參 附作 喉者小黃

芪 秦歸身 大川芎 川厚朴 厚肉桂 防風肉 甘草

即 白芷頭 各等分水煎服如四邊紅不退加紅內消山慈

姑去肉桂如膿濃閉毒倍加川芎如膿水清不乾倍加黃芪日

外口不合再服三貼外用烏枚燒灰存性敷口上 又方 治

潰破者內服前十宜散外用鹽茶洗麻油抹白硃砂散厚攤王

容膏貼之如有汚肉亦如前治法總要化毒生肌歛口治之

癰疽生于腦後對口者名曰天疽 又名對口發其狀大而色紫黑

若不急治熱入淵液前傷任脈內 無肝肺十餘日死急用內托于

金散或千金托裏散外以白硃砂散麻油調敷毒上中間 貼其

口內托于金散 人參 黃芪 歸尾 白芷稍 白芍 官桂

小萼 防風 桔梗 銀花 瓜蒌 甘草 水煎酒間服

癰疽生于腦心者四邊嫩赤腫硬 迎于耳項寒熱痰痛若不急治

百濟金壽長卷之二 附錄 二

毒入于血肉多腐壞膿水從頭中而出血逆痰起不治

癰疽生于頸後者瘡頭向上瘡尾向下肉多腐根形如蜂窠乃反症也其名遂即曰蜂窠發癰腫者易療如痰發或流入兩肩者不治但按腫起者急宜用前方括散內十釐附子并麻赤芍括便裏如病腦癰癰腫作痛煩渴好飲冷水宜除痰火濕熱之劑用活命飲或黃連消毒散加天花粉選用

黃連消毒散 黃連錢 羌活錢 獨活錢 黃芪錢 仁黃錢 黃柏錢 防風錢 紅稿本錢 甘草錢 人參錢 當歸錢 紅花錢 花粉錢 紅桔梗錢 知母錢 宅舍 蘇葉 陳皮

一活命飲 白芍 白芷 川芎 當歸 貝母 陳皮 天花

金銀花 乳香 沒藥 大青 甘草 皂刺角 川山酒藥

如腫毒口乾作渴好飲熱湯為腎虛火熾宜前方歌括內括裏消

毒散或托裏益氣湯選用之

托裏益氣湯 人參 茯苓 白朮 貝母 陳皮 香附

白芍 歸身 熟地 桔梗 甘草 水煎服

如因膏染熱鬱成腦疽者宜用 當歸 黃連 黃芩 酒炒

黃柏 燂連齋 防風 羌活 山茱 甘草 各一 独活 分澤瀉

本壯水浸良久入酒半盞同煎熱服日二次三日尽六服

却將藥清汁調下木香 檳榔末各三錢

乘揀瘋 腦枕後痛浮腫者可針先服大頭腫內開散久服

喉內地黃散 〇頭瘡

頭上生瘡 用黃連 五 蛇床 二 五倍子 一 輕粉 五 分爲末

香油調搽但先宜剃芥葱煎水洗

頭瘡濕爛良方 用燕窠土細搗爲末乾摻或單用石羔半生白

凡火服爲末乾攪

頭上生瘡生虱 用銀硃一錢打爛艾葉及火帛捲筒點灼放搗

為以烟薰之但要布蓋定頭莫使烟出久七重次日瘡漸減
頭上生瘡如梅花點用生鯉魚一個去骨雖不見生水以生薑

末一錢人言三分入魚肉茶油浸焙乾為末乾疹之五六日即
脫去但先宜花椒鹽茶洗淨

禿頭用羊舌根草白礬火煨搗爛敷神効

又禿頭方用烏魚頭一個花椒一撮麻油一大鍾秀釘磨油半

鍾四味將鉄杓盛置火上煎七得魚枯去魚骨探之

梅花疔用金頭蜈蚣一條紫草不拘多少麻油煎成膏紫患處

但先要用茶洗淨加小兒肥瘡去蜈蚣

小兒禿瘡用木油一兩肥皂八錢同煎撈去肥皂以油抹

小兒頭瘡爛成塊久不愈者以花椒末新猪油煎膏調塗三五日愈

小兒滿頭瘡用舊細巾燒灰為末麻油調搽

小兒頭上黃水瘡用雄黃硃砂硫黃寒水石枯凡蛇床子等分

未麻油調搽溫者干

不見頭生紅餅瘡名胎廼先用生艾白芷大伏皮葱白煎湯洗

拭于次用生薑葉入蜜熬膏敷之

大頭腫

大頭腫又名雷頭風是症乃混在高巔之上故頭而痛腫疔瘡甚

邪咽監堵寒害入最速冬溫後多病此症有似湯寒上熱身痛治

宜分表裏三陽

病入頭腫如脉浮表症多者宜清震湯或方括歌內荆防敗毒散

治之清震湯 升麻 蒼朮 各一兩 蓮葉 一皮 木煎服

脉沉裏表見者宜羌活湯為主 羌活湯 羌活 酒炒 黃芩 酒

大黃 酒如連而日鼻面腫者陽明也宜羌黃湯加瓜蒌仁牛蒡子

如腦後項下腫起者太陽也宜羌黃湯加防風荆芥俱水煎時上

如腦後項下腫起者太陽也宜羌黃湯加防風荆芥俱水煎時上

服之取大便邪氣去則止甚者加荊硝

如咽喉腫痛者姜由一兩大黃二兩宜丸彈子大井水化服

如表裏俱解腫不消者磁鋒去血外用開闔散細辛牙皂梃等

及菴蘆少許搗鼻錠以泄其毒

如久不愈欲作膿者內服方括內歌托裏消毒散

如瘡後腫赤不消膿清白者宜大君子湯加桔梗芩丹

六君子湯 陳皮 半夏 人參 白朮 茯苓 甘草

如氣素弱脉微者用人參白朮當歸川芎陳皮柴胡升麻甘草等

分以升舉陽氣用生芩子玄參連翹桔梗減半以解熱毒要知

腫赤便屬純陽脉微便屬陰慎之慎之

頭風神方 翠鳥舌一個以桐油浸晒乾後浸如此不計其數要

舌硬如三稜針一般方仕遇頭風發將鳥舌于頭上亂針即愈

不過三五次即愈

通頭痛風 一辺頭疼如破可針先用開門散次用咽喉內地黃

散合紫證散服后用補藥

開閉散 川芎 白芷 北辛 法 薄荷 葉 紅 爲末 每服二錢食

後用葱湯或熱茶或水調下後服用茶葱煎熱水下

異病

異疽之症乃肝胆怒火或風熱腎虛血燥脾勞所致也方宜隨症治之如怒火風熱宜柴胡清肝湯腫痛甚者晚腦羅內活命飲

○柴胡清肝湯 柴胡 山梔 白芍 黃芩 人參 連翹

一 桔梗 如腎水不能生木以致肝胆火盛血燥髮及酒目腫痛

者或曰肺潮熱宜用甘州川芎白芍熟地柴胡桔梗煎服

如因勞役腫痛寒熱喘滿自汗者宜補中益氣湯去升麻柴胡加

五味麥門冬炮姜煨服

○補中益氣湯 人參 黃芪 坤草 白朮 柴胡 當歸 身

丹麻 陳皮 半夏 桑葉 單方用頭髮灰香油調搽

耳瘡

耳瘡之症乃三焦肝風熱或血虛腎虛火動所致不可不隨症而治也耳瘡發熱癢痛屬三焦厥陰風熱宜髮疽內柴胡清肝湯內熱痒痛出膿寒熱傷數牽引胸脇脹痛屬肝火血虛宜八味逍遙散 當歸 白芍 茯苓 才平 車前 胡椒 甘草 耳中有膿乃腎經氣火熱上冲耳遂使津液壅滯為膿或小兒沐浴水入耳中停蓄搏于氣血醞釀成膿治宜黃龍散枯凡錢龍骨一錢黃丹飛一錢胭脂一錢射香砂為末先以綿枝子展去耳中膿方以藥參入內日日用之勿令風入耳內出膿裏熱痒痛用鹽飽草洗淨入鹽少許共搗末絹帛蘸汁滴入耳內後用枯白庄末將管吹入其中二三次乃効耳內服下赤爛濕痒用黃丹散赤色白凡飛過桑豆粉各一錢

細末若蟻蟻上或腫調深亦可

耳內忽大痛如有虫在內奔走或有血水或乾痛不可忍者其風蛇退皮燒存性爲末以鷄管推入耳中

耳間疼痛如刀割出血流膿久不乾者鳩屎夜明砂吹入內甚神耳濕用陳皮燒灰入耳中數次神效

耳底用桑礪硝一個慢火炙八分熱存性入射一分爲末每用半分搽耳內如有膿先用綿擦去膿方搽

聾耳神方 用蒼朮削尖入耳孔內將艾火置蒼朮頭上灸六七次自愈合架風 兩耳下生一舌核紅腫牙關緊閉口不得開剪刀撬開

以竹寔入內灌地黃散合紫証散右方俱見咽喉類皮株子風 兩耳浮腫生核者老人多有此病宜服咽喉內紫証

散地黃散及大頭腫內開關散百虫入耳 用阿刀于耳邊用磨磨作破即出或用麻油滋之咽

又方用桃葉切碎塞耳口出 又方用慈蒲洗耳中虫自出或閉塞諸竅自出

蜣螂入耳 用猪屎灌耳立出 取猫屎用盆盛猫以生薑擦牙

蒼蠅入耳 用皂角子研爛用生鮮魚血灌耳中即出

蟻子入耳 用猪精肉一指大炙令香置耳孔边即出

蜈蚣入耳 用生薑汁或韭汁灌耳自出或以熟雞肉一盞燻耳

雜物入耳中不得出 以麻絲剪一頭散落牛膠在上松入耳中

使其物粘之徐引出効

水入耳中用薄荷汁點之効 黃豆入耳中用雞翎管截長一二

寸許去其中蕈留少許於一頭以有膜之頭入耳用口氣吸地

肉并

內疳之症生干口上顴廼初發加蓮花根蒂小而垂廼大大最是

虛勞元氣薄也

方治法

以鉤刀決其根

膿

烙以止其血次以雄黃輕粉打

霜白芷日欬為末敷之以槐枝作枕支其牙頰間毋使口含一

二時許瘡癰定合口自便次日出膿以生肌搗之

霍牙疳

用紅棗一個去核包信少許以泔昏異定火內燒并

黃蘗其為末貼牙上

小兒口中生瘡

用薄荷荆芥各一錢栢葉三分半甘草二分共

為末入甘硝青黛硼砂各二分和勻以絹帛拭去口中白腐前

藥少許點舌或密調搽如泄瀉用乳調更妙

口舌瘡

夫口舌為病或為糜爛生瘡或為重舌木舌原其所因未有不因

七情煩擾五味過傷之所致也

口瘡用絲紙散黃柏

硫黃

二錢

右為末搽患處嚙之吐出涎

即愈或單生白凡口含一二出涎效次如神

又方 用黃連黃柏黃芩枝子細辛乾姜各等分爲細末先用

米泔水漱口後搽藥于患處此藥不拘神效

膈癰疽舌上生瘡咽喉腫痛用升麻赤芍人參桔梗干葛各錢

半甘草七分水煎徐徐服

口爛出涎用噙化丸兒茶薄荷寒水石各三分粉草炙荒硝各紅

白凡煨過二分滾丸噙化

口舌痛生瘡用上清丸薄荷葉二兩礪砂五錢天花粉一兩天竺

黃五錢風化硝百葉煎防丰現茶甘草各一兩桔梗七錢

右爲細末煉蜜爲丸加彈子大每用一九噙化

氣口乾口舌生瘡宜礪砂二片腦射香各分馬牙硝風化細塞

水石一兩右爲末以麻草膏爲丸如麻子大不拘時含一九

凡口瘡用涼藥不愈者乃中氣虛相火以無制用于姜人參白朮

等服從治之即愈甚者加附子或用官桂末參之或用乾薑

等服從治之即愈甚者加附子或用官桂末參之或用乾薑

連等分爲未參之証出立効

舌上腫硬 用百草霜研極爲末并花水調敷

又方 用蒲黃末頻搽舌上肉以黃連一味煎湯服之以導心

舌長過寸 古用冰片敷之即收

舌無故出血如泉以槐花爲末參之即止

舌上忽脹出口外俗云是蜈蚣毒用雄雞血一小鍾浸之即縮入

色舌蓮花風乃舌下浮腫生毒可針兩邊尖片切葉針中央先用

地黃散次用紫證散後用三味靈藥或用角藥石方俱見咽喉

未舌風 舌尖角生毒難以轉移紅腫破用針次用堆黃散嘔噦

掩食風 飲食中忽生血泡在腭及舌板左右隨食脹塞不能云

用芒針七破內服地黃散各紫證散方見咽喉

咽喉風 下唇腫痛可針可熨先宜地黃散次紫證散開闕散其

地黃散紫證散方見咽喉具開闕散見大腫腫內

唇燥裂生瘡

宜撒覽燒灰

不拘多少猪油和敷患處

口唇乾裂破成瘡

用蘆甘石

三火煨文蛤兩黃柏兩蒼朮五錢除

甘石三味同炒赤色其研細

八片腦三分研用蠟油調敷唇

水茶南京傳

用上品細茶去梗

一斤用甘草濃煎取汁調兒茶末

六兩冰片一錢拌透細茶

晚次日晒乾

香口膈妙不可

香茶餅南京傳

用孩兒茶四兩

桂花二兩薄荷一兩研砂五錢水

片二分爲末用甘草煎汁熬膏作餅噙化咽下能清上化痰噴

牙齒

夫齒者腎之標骨之餘也足陽明胃之脈貫絡于齒上齦手陽明

大腸之脈貫絡于齒下齦其間有腫痛臭爛者皆山陽明胃有風

邪或濕熱而生虫也惟痛而動搖者多屬腎元虛耳治宜瀉陽明

之濕熱更以擦牙及誅虫之劑投之

上下牙齒疼痛不可忍卒齰痛滿而發熱大痛此是過食辛熱之

物所致也治宜用当丹身 生地黃 黃連 熟地皮絡三升

所到刺水煎稍令服 如痛甚加石羔紅細辛分黃芩紅細茶紅

大黃繼一腫加防丰 荆芥各一錢

牙齒疳蝕牙齦肉將脫血不止治宜神功丸 藿香紅當丹紅生

地黃三酒步黃連紅升麻紅木香紅砂仁紅生甘草紅蘭香葉紅

市為末湯浸蒸研為丸如菜豆大每服一百九如紅生甘草紅

牙床上下腫爛依痛或因楊梅瘡多服輕粉致筋骨疼痛而作牙

腫爛者治宜神燈炷眼法 乳香 沒藥 自然同絡二水銀

礞石花 川烏 草烏 雄黃 銀珠 白芷 絡一珠砂

右為末綿帛裹依條于香油透點灯以瓦片盛煎斗內或桶內

一將手掩其口鼻以口觀燈先將被膜其身子勿令透氣即愈

走馬牙疳及遍口齒落唇穿治宜 婦人渴桶中白垢紅枯白漿

白霜梅稀過各二錢為末聽用可先將非根陳茶製濃汁以雞

羽剪熱汁刷去腐肉洗見鮮血然後敷藥一日三次爛至換者

牙痛神方

裏恩國製用花椒伍射香分紅豆巴豆去糖爲末作

九如梧子大將綿包捲放齒痛處涎不宜吞立効

又方

雄鼠全骨一副投得鼠時打死用稻草緊扎定入人肉

恨熱至爛去肉取骨其要脊全尾骨亦不可少爲末草烏去皮

脂爲末各听加減加酒動者用骨末半草烏未半分齒痛老

各等勻搽于痛即止

爆牙重牙用

白脚蜈蚣條草烏何黃連仁輕粉伍馬牙壳个灯

心灰易粉

其爲末將針上破牙床以藥点即落

包牙風治宜

草烏切兩片久擦痛處自流涎即愈切莫吞涎

牙瀉用

青蓮葉搥爛入鹽搦晒乾燒灰擦牙

牙擦臭爛黑色有虫作痛治宜雞內金一錢白芷五分射香一厘

共為末每服一字或擦思庭亦妙

此二千長

牙痛甚者不拘風牙虫牙治宜 蒼耳子 陳浮麥 羌花楸

花橄 蜂房 葵利 均合以陳醋久收搗蓋待溫熱漱口三

次憑藥水併痰自流口角而出不可吞下服藥時又不可冒風

牙風領菜 一蟾酥一厘川烏尖一厘共研爛丸如麻子大安入

牙縫疼則即愈

角架風 牙關頭緊坐落有痰者可針無痰者不可針只宜地黃

散紫澄散後用靈藥 方見咽喉類

股牙痲 牙脰腫痛口內作燒生痰者用地黃散紫澄散及熏神

効方見咽喉類中節

懸痲瘋 牙脰浮腫白爛者出血不可針用辛皂散敷及用大頭

腫內開散合咽喉內紫澄散地黃散銀鎖鑰并燒

○銀鎖鑰即絲慈化又名玉簪花用好米醋嚼不可吞

牙癰風 牙疳上生而發毒者有內外生者可針可用地黃散有

疾用金鎖鑰兼紫澄散方俱見咽喉 固若之子生

取牙神方 用鯽魚四五兩重者去腸屎將赤脚信末八魚腹內

置淨廵陰乾候起霜制下鱖用每点牙一咳即下

又方 用紅花子兩胆凡爛砂落為末点一次手拈即落

牙落重生京師傳 用公鼠骨一副加鹽法用鼠一小時去皮以鹽

上焙干用 香附一白芷 川 桑皮 地骨皮 用椒 青

鹽 蒲公英 早連草 川槿皮 共為末擦百日其牙換

固齒烏鬚方 龔如虛傳 細辛 石燕 一兩 防風 去皮故芷 杜薺骨

毒鹽五錢 麝香三錢 熟地黃三錢 丁香三錢 香白芷三錢 當歸三錢 紐

味不直 為極末瓦罐收每早百沸湯漱口擦牙三次白芷下

牙散 龔應園製石羔一述香附 二其松二兩只為末擦牙固

齒如神更簡易不甚灰木以便製實

〇〇痰腫 龍苑同

察臆之症延風熱犯其胃初治亦宜分表裏

外因風熱起痛在表寒熱者宜升麻胃風湯

升麻胃風湯 乾葛 白芷 蒼朮 柴胡 桑本 葛根

升麻 草薢 羌活 甘草 黃柏 麻黃 姜豉煎服

經裏二便不利者宜四順清涼飲煎服

四順清涼飲 升身 白芍 地黃 甘草 柴胡 黃芩

如表裏俱解則腫痛又不消欲作膿者宜用助歌內托裏

膏梁厚味胃經積熱臆腫作痛或發寒熱者宜服二連湯

二連湯 黃連 連翹 升麻 牛蒡子 白芷 等分水煎

如連耳上太陽部分腫屬風熱宜二連湯加羌活防辛

如連耳後少陰部分腫屬相火宜二連湯加知母黃柏

頭面牙齒俱腫內熱口乾者治宜犀角升麻湯

犀角升麻湯 白芷 防風 川芎 白附子 羌活

續斷

牙齦唇口俱腫出血者治宜消胃散加石羔

消胃散 歸身 生地 黃連 牡丹皮 各三升麻 桑下

如內傷生冷涼藥不能消潰食少體倦者治宜髮疽內補中

如內傷氣血俱虛者治宜八物湯加麥門冬五味子

八物湯 當歸 川芎 白芷 熟黃 人參 白朮 枳殼

如內傷七情有寒熱者治宜八味逍遙散煎服力見病除內

八味丸 熟地黃 杜仲皮 石朮肉 白茯苓 淮山藥

新澤瀉 大附子 厚肉桂

如傷色欲腫痛及頰腫者治宜八物湯加黃芪肉桂或八味丸選

用慎毋悞移風逆之劑

床鳴外治單方 用赤豆為末以雞膏調塗

瘡瘡風良方 荆升麻 牡丹皮 黃芩 石羔 土生地 當

疔尾 防丰 赤芍 制刑水煎熱服屢效

牙胎瘋 兩腮生痼毒日久透八口內初起二個至八九個者不

治先用角葉針重服地黃散紫澄散方其見咽喉

魚腮瘋 兩腮浮腫痛者用用葉可針可燠用地黃散紫澄散金

鎖鑰只一边生者不同治亦相同方俱見咽喉

面瘡

男婦小兒面上生無名腫毒治宜用防丰 荆升 連喬 皂次

姜虫 紅花 苦參 虫退水煎食後服但先一貼倍用升麻

外用莖菜地內蚯蚓屎壁上土蜂窠其為未香油調搽

面上細瘡常出黃水用桃花陰乾為末熟水調服外用杏花煎湯

洗之或官粉煨乳香等分脂胆調搽

面上生五色瘡宜用鹽湯綿裹瘡上日五六易之

痘頂發苦豆梅瘡而多汁延蔓而耳內外濕爛各走皮癢瘡先
用桑寄生根皮各一握白芷黃芩冬小許煎湯以綿蘸洗候惡
血出盡拭乾次用皂莢箬竹根俱燒存性黃柏黃連梔葉白芷
各等分爲末麻油調搽忌醋

大面卒得赤黑丹如疥狀不急治至遍身有即死宜急用麝香
頭面生孔出膿臭爛各遊面瘋治用陳沙糖調酒服每日三次

唇瘡用芙蓉花或葉煎水抹洗

面皮裏痛用何首烏末姜汁調敷以帛蓋炙熱鞋底熨之

面上皮汗斑用白附子爲末監卧先以水洗面後以白蜜化傅塗

唇上貼之漸次自落

面上雀卵色用棧羊胆一枚酒一碗煮三沸塗拭之日行三度

無故瓜破面皮速將生薑汁調輕粉末搽面上患處立時無痕迹

頭面腫發泡者可用大頭腫內開散次用明礬肉

藥洗但針要自下針上以便流出膿血

搭頰風 兩頰一邊浮腫者名單搭頰兩邊赤腫者名雙搭頰可

針服咽喉內地黃散紫澄散但各要着牙脰腫不腫如牙脰不

腫不是搭頰不針亦可只服前藥

羊鬚落痒不可當治宜灰麵松油麻油煎過調搽或羊油燒

洗面藥 皂角升麻 砂仁 白芷 白芷 花粉

甘松 三奈 砂仁 白下香 白芨 白芷 花粉

彈子大量用洗面去垢潤肌治生野七又或生小瘡或生癰瘰

粉刺皮膚燥痒

玉容丸 鉛粉三兩 白芨 白欬 乾胭脂 共研為細末

子白調丸如肥皂大日日洗面容自嫩

香肥皂 南京程氏松傳排草 廣草二兩 丁香二兩 檀香

香

白芷四兩 其松二斤 蘇合香一兩 射五升 每用香末二兩入瓶
皂末一斤 將胎糖十二兩作丸 去垢香躰潤肌極妙

咽喉 附梅核氣

喉嚨一身之總與胃相連呼吸之所胃隔之間蘊精熱毒至生風
痰壅滯不散發為咽喉之疾其症雖繁同并于火蓋火者痰之本
痰者火之標故言熱痰在中矣言咽喉則牙舌亦包在內矣但咽
瘡忌汗最不誤人者惟砭針出血七出多愈當知此症治不宜緩
若胸中氣急心脇如刀刺二便閉結乃危症也原有方欲云大小
二便俱閉結紫澄地黃兼最切痰多須用金鎖匙服後腹中除却
熱非人勿授珍重之此是神仙真口訣

雙鵝瘟

咽喉間生兩枚癰毒于兩邊不可針先用角藥與磨風

膏打和些子用鵝毛挑入毒上令病人閉口噙良久滿口痰吐
出如未破用煙藥三味散去金毛狗脊加江子肉七粒打碎去

○銅鎖題

即偏竹根或八葉肉同煎服或用好酒醋攷吮可愈

單雙纏喉瘋

咽喉兩塞不明自四畔皆腫者各獲纏喉一邊腫

者各用纏喉俱用藥吐痰次用硼砂散及前地黃散

○硼砂散

腦子五厘 牙硝各 牙熊胆 牙射二

末或吹或薄荷煎水吞下

○松子瘋

喉頭邊生毒形如松子治法同前

○燕子瘋

舌根邊浮腫上舌者治法亦同前

魚鱗瘋

喉頭生紅黃瘡亦如松子樣日久但起白鱗此症十無

斗底瘋

咽喉腫下生紅黃瘡初痛過癢水者可治不可煙只用

青白散吐痰後用煎硼砂散如病極過水漿不得過身寒

痛氣急腦前腫赤如吐痰不得者不可治暫用前煙熏三時

○青白散

胆凡 白凡生研青黛一水片各一總八猪胆內陰

乾臨時取用但先以醋浸痛極洗之洗後以藥搽貼如腫

喉瘡風 喉生瘡或滿或紅或白宜用煎地黃散兼金鎖匙

瘡痛甚用硃砂牙硝各四分神砂五分青藥三分黃連薄荷各

三分片腦半分爲末竹管吹入喉中有瘡處

金鎖匙 川烏夫彼淮地味彼薄荷葉一匙右爲末每食後淡

茶調下錢能疎風腫川烏肥麻人忌冷水如麻只服生薑汁解

腫喉風 上脰風腫生瘡腐爛先用前青白散吐痰及用前地

黃散紫澄散或前鎖匙搽之如或出膿者久以八七孔相穿之

所腐爛不一者可用前熏洗法外搽金鎖匙內服地黃散

帶中風 帝中紅腫大生毒疼痛不能飲食先用角藥次用地黃

散若帝中黑色爛不可治切不可針又云帝中腫者亦思針但

宜蛇床子于瓶中燒烟令病人吸八喉中立念如土脰帝珠忽

長一寸以筋頭懸點數次即收

落架風 因飲食後或大寒或呵欠落下脰不能合架此是氣血

百功全書卷之二

因集醫類

不順所以筋不收宜針頰車下閃將手托上內服防風荆芥羌活細辛丹尾白芷稍姜虫甘草節

又方 先用車前草煎水洗口復含隨以兩手移下即拍上如神

白蟻瘡 生于咽喉及鼻孔與爛者是也治宜枯凡一錢白霜梅

一存性一個雄黃川山甲炒成珠取五分為末將竹管吹入喉

中寒喉閉吞吐不利用附子切片蜜塗炙黃 每令一片嚥汁未

盡再投一片 口喉間生肉管上相益漸上腫起不多日乃有

瘰子臭氣自出遂退飲食用臭橋葉煎水服

返魂漿 藥慶圓製 治喉痕不拘淺卑鵝瘋諸症臨危可救如神

于牛膝 紅膝節 洗淨搗爛入濃糯米泔三茶匙同取出汁來再

將茶子仁搗爛入婦人乳二茶匙同取出汁來調和右喉瘋吹

入灌左鼻左喉瘋吹右鼻 雙鵝風兩鼻俱灌三五次畢竟吐痰

而愈後切忌熱毒物咸單用土牛膝與奶乳同汁灌鼻亦妙

○蓬萊雪如盧兄傳台喉風如神

硼砂一錢黃 芷硝各二能 胆兒茶各一枯凡一分 共為

末火上焙乾再研再焙乾方八片腦二分吹入喉中內用防

羊通至散加射香一分調入服之以利為度方見方枯歌內

○二虎丹九季兄傳 治喉風神効

川椒金一巴豆肉一 半生一半用猪油煎炭炭俱為之吹

吹喉散傳不拘乳 鵝咽喉腫痛

硼砂二牙硝五分米片半分 吹入喉中痛即止若張口不

開用牙宅細牙硼砂青黛姜蜜各一錢玄參山豆根各五分

共為末男左女右吹入鼻中即開

○銀鎖匙 善治病喉瘋心煩口燒作渴 天花粉 薄荷葉各

兩為末每食後并花水調服二錢熱甚西瓜汁調服

○鐵鎖匙 治牙關緊及開口不得手常不可用

皂角一个去核每肉八巴豆一粒黃泥固濟燒灰存性為末射香少許要薄荷淡茶調下

○平喘喉痛良方 虛室兄傳 桔梗二系 甘草一系 玄參一系 貝母各

半 牛旁子 知母 結一薄 荷葉 水煎寬容嚥下

○清咽丸 父傳 用薄荷葉 牙枯梗 柿霜 甘草 四朋砂

兒茶 結三永片 仁其為末 煉蜜為丸 彈子大 不時喉痛如

梅核氣 此疾因積熱生痰後痰結如核在喉中吞之則下不吞

則在喉但可以進水不可以進飲食庸醫不知多誤作翻胃症

治祖傳先用逐痰丸次用藥磨湯 活絡散

○逐痰丸 陳皮 土白 半夏 七系 南星 礞石 炮 香附子 去毛各

用白礬一兩熱水消化煮前四味後用牙皂一兩煎水打米糊

為丸每半空心姜湯不拘多少送下

○藥磨湯 川厚朴 白茯苓 大半夏 紫蘇葉 結四 姜七片

聖二枚水一盞煎至六分將熟藥水傾少許入粗碗內磨碎
五味射干一塊檳榔一次芎藭一塊沉香一塊枳壳半個
次八葉碗內用力各順磨五十下仍入前藥和勻食遠服之
重者六七劑而愈上後一十日再服舌蝕散

口舌蝕故真立明粉一分具母二分共研末每飯後以舌蝕少

五水用海粉一分五海粉一分五共研末每飯後以舌蝕少

許鳴下少脰片時取効

瘰癧

天瘰癧之症生頸前項側結核如大豆如銀杏或在耳后連綴
至缺盆皆為瘰癧若生胸脇腋下堅硬如石形如馬刀更曰馬刀
瘰癧乃多氣少血之病總皆手足少陽所主其瘰癧則尖而小熱瘰
血瘰癧則煖腫赤色瘰癧則推動滑軟氣瘰癧則圓而動羣瘰癧則大
小不一治者先辨審可內消者即內消之不可內消即用外治

頻不詳經絡血氣多少脉症受病之異內用牽牛橫及流氣
 敗十宣五香之類勿妄施針灸鑢子血氣必傷而寔七虛七之禍
 吾指諸掌自當知此症成潰濕而不痛降火滋腎水且病人久不
 清心戒口則潮汗咳嗽惡症蜂起其可生乎但視其自內赤脉豈
 睡人有几條則知其几半死面色微自金克木脉洪大為元氣虛
 極俱為不治故曰寔症虛者可慮

吳繼泉傳云治此疾未針灸者先發表春秋冬用香蘇散夏用

二香散次服山龍札內消百癰湯王燭散外用三

○山龍丸 蚰蛇根 百部 配牙皂 配人參 川芎 丹尾

菊花根 天麻 白附子 醋乙甘草 症人米飯為丸 附根湯

○內消百癰湯 牛下 天麻 川芎 金銀花 丹尾 白芷

皂刺 甘草節 防丰 陳皮 天花粉 人參 白朮 貝母

乳香 煨草 令二 赤芍 西兩 大米飯為丸 酒下

○王蠟 斗母 川芎 赤芍 生地 大黃 朴硝 黃連

甘草為末每二錢姜湯調下

○二仙丹 白凡 黃丹 雄黃 名等

右為末刺核出血貼之以太平膏貼之

○太平膏 片腦 麝香 輕粉 乳香 沒藥 各二錢 射五分

右為細末用香油十一兩葱七根入鍋內熬葱色如蜜黃法

入黃丹五兩用柳枝攪不住手煎成膏方入前液藥

翼加虛秘授治癰癤 痰核流注神方未破者單用消癰散酒調服

已破者用加味五海飲敷貼酒煎調消癰散全服

○消癰散 牛膠 炒 所珠 川山甲 炒 所壁 土 大黃 炒 酒 九 蒸 九

兵為末每用酒調二三錢服之

○加味五海飲 海藻 海粉 海布 海石 海帶 和風柳

防風肉 明貝母 沉香 礞石 用酒煎每貼入消癰散二三錢

楊淵默得治癰瘰癧外用巴豆十四個雄黃一錢四分將鯉魚一

箇刺去腸屎以前藥入十魚內黃泥固濟火煨令干切為末香油

調搽口內用黃芪南星荆芥白芨白芷芳芳尾甘草煎服口次

用木別當并地黃知母貝母川山甲甘草煎服口後用訛復葉各

分地龍火煨過研內血竭礞石三共為末攤生肌散口

九華傳治鼠瘻妙方先用全蝎貝母六黃南星半裏黑丑金銀花

木別子牙皂角安垂地蜈蚣三兩全煎六貼服口後用黑豆

九箇西鷺絲藤六兩夏枯草三兩南蛇根二兩共煎酒二瓶上用

火帝七重包上面及糯米几粒後用箬葉包扎大碗蓋必要糯

米成飯方好停一朝每日食後三服

癰疽疏胸膈爛者治宜青皮陳皮桔梗貝母白芷皂角一個連喬

五乳香沒藥黑亭牛共為末用新薄荷汁熬成膏入

箭木為丸梧子大每以連喬湯送下五十九

癰痛不可忍用黃連黃柏鬱金虎腦硃砂乳香沒藥白芷比

其為細末以泉調作錠子陰于插八孔中痛即止

癰瘡除消酒皂刺五土扶苓一兩半藤即八手地茄根七手飛不

立根以和風椰根一皮頭酒三瓶并雞蛋一每早先服酒及蜜

林甲梧傳治癰瘡神方生屋角蛇一條瑯瑤黃泥做匣盛貯以

白凡末五錢放上仍做泥匣蓋倒如棺木樣封固用火燒煨取

出篋虎不用每晚好酒只送下凡末半分

癰瘡仙方林同弟傳不拘已破未破俱効

當月防風羌活獨活具母金銀花皂角刺

比柴胡海石絡乙白芨白欬絡五南星瓜夏枯草

蛛二個另用打瓦臨吃藥時以如連服二十貼即愈

少湯卻頭頂則有核堅而不潰身無力者治宜柴胡

草黃芩枳殼三稜桔梗黃連紅花煎服

雲林傳散腫潰堅湯

治馬刀瘡結硬如石或在耳下連鈔益

或在肩下或于脇下皆手足少陽經中及瘰癧遍流胸脇結核者而不出在足陽明經所出或二瘡已破乃流膿八並治或生於耳後皮頸項下領者俱宜治之

散腫潰堅湯

升麻酒洗葛根酒洗白芍酒洗二尾酒洗連翹酒洗黃連酒洗黃芩酒洗半枝蓮酒洗知母酒洗桔梗酒洗龍胆草酒洗昆布酒洗三棱酒洗莪朮酒洗海藻酒洗甘草酒洗天花粉酒洗石到酒洗每一兩用水一盞先浸半日煎至一盞去渣熱服于臥處俾足在高處頭微低每嚥一口作十次嚥至服畢依常服臥使藥在胸中停蓄也另損半料作細末煉蜜為丸如藥豆大每服百九或一百五十九此藥湯膏一口送下

天花散 治瘰癧爛疼痛

天花粉一名穿山甲 赤芍 白芷 乳香二錢

沒藥各一錢 貝母一錢 計星 金銀花各一錢 共剉好酒服

○代食散 治瘰癧潰爛臭不可聞久不能愈

官粉 雄黃 銀珠 硫磺 香紅石 為細末用桑皮一斤將針

密上封孔置磨上七粒藥於上以炭火炙熟真令病者惡氣

八瘡中痛熱為止甚者換三次輕者二次全愈

友人病瘰癧經閉有潮或咳者死經閉無潮及經調者可治

用前下爛散和血歸經服之自消一日二服七八日見効如不

効者用升麻調經湯久閉者用前加味逍遙散或桑椹膏丸

○桑椹膏丸 桑皮半夏茯苓升麻芍藥芍藥黃牛膝龍骨其

草血丹參神曲為末以桑椹膏湯丸菜豆大每五十溫酒下

○升麻調經湯 升麻 龍胆草 黃芩 黃柏 黃連

連翹 三稜 莪朮 當歸 白芍 甘草 或加陳胡

癰疽瘋 諸頭紅腫生核者用角葉無時敷宜用次頭腫內開散散反咽喉內紫證散地黃散

癰疽

癰疽之症頭項生核裏連筋骨外連皮膚紅不痛不作膿瘰之類動亦不第及千四肢癰癰聚不散也不可用癰癰藥治

十六味流氣飲去抵柳外用拔毒散口涎調搽以膏藥貼如去毒用前化毒散攪三日後用生肌散生肌結口

二陳消核湯 陳皮 半夏 枳殼 防手 白芷 貝母

天麻 吳茱萸 山慈姑 連翹 海藻 防風 木香 枳殼

十六味流氣飲 當歸 黃芪 桔梗 厚朴 蘇葉 烏連

白芍 人參 川芎 肉桂 白芷 厚朴 蘇葉 烏連

甘草 抵柳

疫毒族

巴豆肉二

分八言三分生白丸服凡幼雄黃仁蟬

牛十個共為末將山涎調搽核上以膏應新貼之二日一換

過再將玉玉膏貼一日一換

江氏疾瘰肉消方

側指子

五雄黃五皂角

經山慈茹一天門冬

五金良花五和風柳樹兩貝母兩痛

如乳香沒藥各五

如核不痛不動加射香初已上俱畧炒過

其為粗末每酒一壘用藥末四兩以布袋包裹藥熱去滓留酒

每月不拘時服但念後斷根要在兩手曲池穴灸三五丸

○單方用紫背天葵草初酒飯後服

如虛秘傳核氣神方

宜以川山申一兩金銀花白芷稍

蚕 蟬退 大黃

丹尾連荷三其草一酒共為末

入鴨蛋內重者十四箇輕者六七箇將蛋去白一半入藥攪勻

蒸熟酒下每日只服一箇服完蛋後再腫可灸之後服九葉

口九藥 川山甲 皂刺 漏芦 防丰 滑石 赤小豆 夏

枯萆 右各等分 共為細末 酒打米粉為丸 每酒下三十九

口痰癰搽藥 用鵝蛋壳內嫩皮燒灰 將鵝蛋白調搽極妙

痰核方 用人參 歸尾 熟黃 胆草 黃芪 姜黃 黃連

梳炭 知母 黃芩 桔梗 海布 柴胡 三稜 莪朮

連齋 干葛 天杜粉 各二末 為末酒調服

應園製項下或手足起移神方 用桔梗 枳壳 青皮 赤芍

連齋 半夏 陳皮 赤苓 防丰 歸尾 天花粉 前

胡 川活 玄參 十服即散 口或蠟丸亦効

頸下核物疼痛 川烏 蜈蚣一味 用生酒全煎食下去 痒服醉臥

床上患左側卧 左右如之 把手按枕上 腫醒方起

癭瘤

夫癭瘤皆因血氣凝滯 結而成之 且因喜怒所生 多致于結而成

破去脂粉則愈或有妨垂下根其小者生用藥其蒂紅如落血

○南星膏 生大南星三枚細研稠粘滴好醋三七点為膏如無

生者以乾者為未調你膏先將小个刺瘡上令氣透則貼之

瘰癧單方 用山羊角米酒浸均台為丸貼服神効

如腫傳治瘰癧氣大塊初用三海湯次用消癰丸多服神効

○三海湯 海藻 海帶 海布 金櫻子 川練子 桑木通

通草水煎木香研開服數劑

○消癰丸 海藻 海帶 海布各一兩俱洗海蛤 煨硝

泥香各三兩木香五兩連齋 角回略一川木通

次枳壳絡七如冷者加干姜石諸藥俱搗湯末藥為丸

頭毒

男婦小兒頭上或腋下生無名瘋毒治宜羌活 防朮 川山

紅肉消 紅肉消 紅肉消 紅肉消 紅肉消 紅肉消 紅肉消 紅肉消

百病全書卷之二 二二

小芳 粉草 桔梗 升麻 貝母 苦粉 生薑 熟地 二劑下

如頭上生毒大而根白乃血少氣衰治宜防丰 白芷 當歸

川芎 茯苓 黃芪 肉桂 厚朴 羌活 細辛 白芍

小參 貝母 此草 山慈 紅肉消 川山 蜈蚣 煎服

頸上生瘡作痒出水乃肺經有熱毒治宜青鹽海藻 鹽礬 姜

虫 蒺藜 升草 白水煎半空心服四五貼再用大黃七拍

黃芩 連翹 疾疔 斷皮 苦參 共合四貼外用烏桕根

半斗左經一把同炒熟傾入盆內功皮硝配泡化入洗神效

楊核毒方 用蓮亮燒灰酒調初服三分後服五分

掩頸瘋 頸項淨腫治宜用角藥用針先服紫證後服地黃散

石方與見明喉 可推兩用之